



Cuente recuerdos, no calorías

Dé su próximo paso con
BAFIERTAM[®] (monometil fumarato)

Indicación e Información de seguridad importante seleccionada

¿Qué es BAFIERTAM[®] (monometil fumarato)?

- BAFIERTAM es un medicamento con receta utilizado para tratar formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), para incluir el síndrome clínico aislado, la enfermedad remitente recurrente y la enfermedad progresiva secundaria activa en adultos.
- Se desconoce si BAFIERTAM es seguro y eficaz en niños.

¿Quién no debe tomar BAFIERTAM?

- No tome BAFIERTAM si: ha tenido una reacción alérgica (como ronchas, urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca o lengua, o dificultad para respirar) a monometil fumarato, dimetil fumarato, diroximel fumarato o cualquiera de los ingredientes de BAFIERTAM.
- No tome BAFIERTAM si está tomando dimetil fumarato o diroximel fumarato.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 4 y 5 de este folleto y la [Información de prescripción](#) completa e [Información para el paciente](#) adjuntas.

BAFIERTAM (monometil fumarato) le da la libertad de elegir

Las calorías se acumulan rápidamente

Estas elecciones frecuentes pueden enviarle rápidamente por encima de la cantidad recomendada*:

Quarter Pounder de McDonald's con queso	510 cal.	26 g de grasa
Papas fritas medianas de McDonald's	380 cal.	19 g de grasa
Coca-Cola, 12 oz	140 cal.	-
Pollo Chipotle (con arroz, frijoles, crema agria y queso)	950 cal.	37 g de grasa
Sándwich Bravo con panceta y pavo de Panera Bread	870 cal.	41 g de grasa
Caramel Frappuccino de Starbucks, Grande con crema batida	390 cal.	15 g de grasa



BAFIERTAM puede tomarse con o sin alimentos

- ▶ **SIN** contar calorías
- ▶ **SIN** cambios en los hábitos alimenticios
- ▶ **SIN** restricciones en cuanto a la dieta
- ▶ **SIN** restricciones en cuanto al alcohol

*No más de 700 calorías y no más de 30 gramos de grasa por comida o refrigerio con VUMERITY

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 4 y 5 de este folleto y la [Información de prescripción completa e Información para el paciente adjuntas.](#)

Bafiertam[®]
(monomethyl fumarate) delayed-release capsules 95mg

El tamaño del comprimido es importante

El 43 % de los pacientes con EM tienen dificultad para tragar

BAFIERTAM ofrece una dosificación flexible

BAFIERTAM se suministra en cápsulas de 95 mg y en dosis de 2 cápsulas dos veces al día

BAFIERTAM (MMF)

190 mg,
dos veces al día



Tecfidera (DMF)

240 mg,
dos veces al día



Las píldoras se muestran en escala, pero no en tamaño real.

Programa \$0 Copay

Ofrece a los pacientes elegibles un copago de \$0 al inscribirse en la tarjeta de ahorros de BAFIERTAM[†]

Programa QuickStart

Proporciona un suministro de BAFIERTAM para 30 días para que los pacientes comiencen el tratamiento

Programa Bridge Support

Ayuda a los pacientes a continuar con la terapia hasta que se asegure la cobertura[‡]

Ejemplo: Como resultado de cambios en la cobertura del seguro o demoras en la reautorización



Obtenga más información sobre los recursos de apoyo al paciente en [BAFIERTAM.com](https://www.bafiertam.com)

[†]El Programa \$0 Copay es para los pacientes mientras toman BAFIERTAM y está sujeto a un límite anual en la cantidad de asistencia que los pacientes pueden recibir. Esta oferta no es válida para pacientes cubiertos por algún programa gubernamental, incluidos, entre otros, Medicaid, Medicare, VA o TRICARE. Las leyes federales y estatales y otros factores pueden impedir o restringir de otro modo la elegibilidad.

[‡]El Programa Bridge Support puede proporcionar hasta 24 meses de cobertura.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 4 y 5 de este folleto y la [Información de prescripción completa](#) e [Información para el paciente adjuntas](#).

Indicación e Información de seguridad importante

¿Qué es BAFIERTAM® (monometil fumarato)?

- BAFIERTAM es un medicamento con receta utilizado para tratar formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), para incluir el síndrome clínico aislado, la enfermedad remitente recurrente y la enfermedad progresiva secundaria activa en adultos.
- Se desconoce si BAFIERTAM es seguro y eficaz en niños.

¿Quién no debe tomar BAFIERTAM?

- No tome BAFIERTAM si: ha tenido una reacción alérgica (como ronchas, urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca o lengua, o dificultad para respirar) a monometil fumarato, dimetil fumarato, diroximel fumarato o cualquiera de los ingredientes de BAFIERTAM.
- No tome BAFIERTAM si está tomando dimetil fumarato o diroximel fumarato.

Antes de tomar y mientras toma BAFIERTAM, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene o ha tenido un recuento bajo de glóbulos blancos o una infección.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si BAFIERTAM dañará al bebé en gestación.

- Está en periodo de lactancia o planea amamantar. Se desconoce si BAFIERTAM pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras utiliza BAFIERTAM.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BAFIERTAM?

BAFIERTAM puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Reacción alérgica** (como ronchas, urticaria, hinchazón de la cara, labios, boca o lengua, o dificultad para respirar). Deje de tomar BAFIERTAM y busque asistencia médica de emergencia inmediatamente si tiene cualquiera de estos síntomas.
- **LMP (leucoencefalopatía multifocal progresiva)** una infección cerebral rara que generalmente provoca la muerte o discapacidad grave durante un periodo de semanas o meses.
 - Informe a su médico inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas de LMP:
 - debilidad en un lado del cuerpo que empeora
 - torpeza en brazos o piernas
 - problemas de visión

Información de seguridad importante (continuación)

- cambios en el pensamiento y la memoria
 - confusión
 - cambios de personalidad
 - **Infecciones por herpes zóster (culebrilla)**, incluidas las infecciones del sistema nervioso central.
 - **Otras infecciones graves.**
 - **Disminuciones del recuento de glóbulos blancos.** Su médico debe hacerle un análisis de sangre para comprobar su recuento de glóbulos blancos antes de comenzar el tratamiento con BAFIERTAM y mientras esté en terapia. Debe hacerse análisis de sangre después de 6 meses de tratamiento y cada 6 a 12 meses en lo sucesivo.
 - **Problemas hepáticos.** BAFIERTAM puede causar problemas hepáticos graves que pueden provocar insuficiencia hepática, un trasplante de hígado o la muerte. Su médico debe hacerle análisis de sangre para comprobar su función hepática antes de empezar a tomar BAFIERTAM y durante el tratamiento si es necesario.
- Informe a su médico inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas de un problema hepático durante el tratamiento:
- cansancio intenso
 - pérdida del apetito
 - dolor en el lado derecho del estómago
 - tiene orina oscura o marrón (color del té)
 - coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos

Los efectos secundarios más frecuentes de BAFIERTAM incluyen:

- Rubefacción, enrojecimiento, comezón o erupción.
- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago o indigestión.
- La rubefacción y los problemas de estómago son las reacciones más frecuentes, especialmente al inicio del tratamiento, y pueden disminuir con el tiempo. Llame a su médico si tiene alguno de estos síntomas y le molestan o no desaparecen. Pregunte a su médico si tomar aspirina antes de tomar BAFIERTAM puede reducir la rubefacción.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BAFIERTAM. Llame a su médico para obtener consejo sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. **Para obtener más información visite dailymed.nlm.nih.gov.**

Consulte la **Información de prescripción completa** e **Información para el paciente adjuntas.**

Esta información no sustituye la consulta con su médico sobre su condición médica o su tratamiento.

No permita que su terapia para la EM dicte cómo celebra su vida

¡Hable hoy mismo con su médico sobre BAFIERTAM!

GO DIRECT 

Obtenga más información
sobre cómo comenzar o
cambiar de tratamiento en
[BAFIERTAM.com](https://www.bafiertam.com)

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 4 y 5 de este folleto y la [Información de prescripción completa](#) e [Información para el paciente](#) adjuntas.



© 2022 Banner. Todos los derechos reservados. BAFI-US-0105-ES 04/22
BAFIERTAM® y el logotipo de Banner son marcas comerciales de
Banner Life Sciences. Todas las demás marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos dueños.